



# Rättelser till Sjuksköterskans kliniska färdigheter

s. 155 Tillägg efter texten: "Vid behov, för att hitta tillbaka till den utsedda venen, pumpa upp blodtrycksmanschetten igen."

Desinficera insticksstället och det hudområde som kommer att hamna under förbandet med klorhexidinsprit 5 mg/ml. Gnid med en genomfuktad kompress minst 5 sekunder och låt lufttorka. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar.

Se till att patienten ligger eller sitter bekvämt.

Desinficera dina händer och sätt på dig plastförklädet. Koppla samman injektionsventilerna med trevägskranen (om dessa inte redan finns på trevägskranen) och fyll systemet med natriumklorid 9 mg/ml så att all luft försvinner. Tänk på att båda injektionsventilerna ska vara fyllda med natriumklorid. Först fyller du ena injektionsventilen med natriumkloridsprutan och därefter flyttar du sprutan till den andra injektionsventilen och spolar igenom trevägskranen. Stäng kranen. Var noga med att inte komma åt de sterila kranmynningarna eller injektionsventilens membran. När trevägskranen är fylld lämnas sprutan kvar kopplad till injektionsventilen på trevägskranen och läggs tillbaka i den öppnade förpackningen.

Lägg ett underlägg under patientens arm för att skydda kläder och sängkläderna mot eventuellt spill.

Placera en blodtrycksmanschett (alternativt ett stasband) på patientens arm och pumpa upp till 40–60 mm Hg. När du hittat lämplig ven släpper du stasen.

Desinficera händerna och ta på skyddshandskar.

Vid behov, för att hitta tillbaka till den utsedda venen, pumpa upp blodtrycksmanschetten igen.